



EMCDDA Harm Reduction Initiative

Augmenter le nombre de tests de dépistage du VHC et mieux orienter vers les services de prise en charge pour addiction pour les usagers de drogues injectables

Test de connaissances pour les personnels des structures de prise en charge des usagers de drogues

Introduction:

Que savez-vous de l'hépatite virale et des tests et traitements disponibles ? Ce court questionnaire nous aidera à découvrir les sujets sur lesquels les personnels sont moins sûrs d'eux afin de proposer plus d'informations et de formation dans ces domaines - et nous espérons que ce sera une mise à jour de vos connaissances que vous trouverez utile !

Le questionnaire est anonyme et ne vise pas à évaluer les gens, vous pouvez donc le compléter honnêtement et sans crainte. Pour chacun des énoncés ci-dessous, veuillez indiquer si vous le saviez déjà ou si c'est nouveau pour vous :

A. Hépatite C	Je le savais déjà	C'est nouveau pour moi
1. La prévalence de l'infection par le virus de l'hépatite C en population générale en Europe est généralement faible (inférieur à 2%).	()	()
2. La prévalence de l'infection par le virus de l'hépatite C chez les usagers de drogues injectables en Europe est généralement élevée (souvent 50 % ou même plus).	()	()
3. Le dépistage et le traitement de l'hépatite C présentent des avantages tant pour les personnes traitées pour le virus que pour les autres, car la transmission du virus est réduite.	()	()

	Je le savais déjà	C'est nouveau pour moi
4. Le virus de l'hépatite C (VHC) est principalement transmis par le sang, et plus rarement par voie sexuelle.	()	()
5. Le VHC est beaucoup plus contagieux que le VIH par voie sanguine.	()	()
6. Le VHC peut survivre à l'extérieur du corps pendant des heures, voire des jours.	()	()
7. Le VHC peut être transmis par le partage de seringues et d'aiguilles usagées.	()	()
8. Le VHC peut être transmis par le partage de filtres non nettoyés.	()	()
9. Le VHC peut être transmis par le partage des pailles ou des tubes utilisés pour sniffer des drogues.	()	()
10. Le VHC ne peut pas être transmis par des aliments, de l'eau de boisson ou des contacts occasionnels (en se tenant la main, par une accolade, ou en s'embrassant).	()	()
11. Le VHC peut être transmis entre usagers de drogues injectables en partageant un récipient d'eau pour prélever de l'eau lors d'une injection de drogues.	()	()
12. Entre usagers de drogues injectables, il est possible de contracter le VHC en partageant une cuillère servant à la préparation de l'injection.	()	()
13. La première étape du test de dépistage de l'hépatite C consiste à tester une personne pour voir si elle possède des anticorps anti-VHC dans le sang (anti-VHC positif).	()	()

	Je le savais déjà	C'est nouveau pour moi
14. Des tests de diagnostic rapides utilisant du sang provenant d'une piqûre au doigt pour détecter l'anti-VHC ont été développés. Ils sont faciles à utiliser et fournissent des résultats rapides (dans les 20 minutes qui suivent l'utilisation du test).	()	()
15. Être séropositif au VHC peut signifier qu'une personne est actuellement infectée par l'hépatite C ou a déjà été infectée et qu'elle a éliminé le virus.	()	()
16. Pour confirmer la présence du virus de l'hépatite C chez une personne anti-VHC positive, un test sanguin supplémentaire est nécessaire (réaction en chaîne de la polymérase (PCR) ou test de l'antigène principal).	()	()
17. Lorsqu'ils sont correctement informés, la majorité des usagers injecteurs de drogues qui se voient proposer un test de diagnostic accepteront et apprécieront de connaître leur statut VHC.	()	()
18. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande le dépistage régulier du VHC chez les personnes qui continuent à adopter des comportements à risque liés à la consommation de drogues.	()	()
19. Les personnes présentant une infection aiguë au VHC peuvent présenter des symptômes spécifiques peu après l'infection (douleur abdominale supérieure, jaunisse, nausée, par exemple), parfois ne présenter que des symptômes non spécifiques (fatigue), mais souvent n'ont aucun symptôme.	()	()
20. Une infection au VHC devient chronique dans la plupart des cas.	()	()

	Je le savais déjà	C'est nouveau pour moi
21. La majorité des personnes atteintes d'hépatite C chronique ne présentent aucun symptôme pendant des décennies.	()	()
22. L'apparence d'une personne ne permet pas de savoir si elle est infectée par le VHC.	()	()
23. Si elle n'est pas traitée, l'hépatite C chronique peut causer de graves dommages au foie et éventuellement conduire à la cirrhose et au cancer du foie.	()	()
24. Il n'y a pas de vaccin contre l'hépatite C.	()	()
25. Il ne suffit pas de rincer les seringues et les autres matériels liés à l'usage de drogues avec de l'eau pour se protéger de la transmission du VHC.	()	()
26. Les préservatifs préviennent la transmission du VHC par voie sexuelle.	()	()
27. Après un traitement réussi de l'hépatite C, il est possible d'être réinfecté si l'on est à nouveau exposé au virus.	()	()
28. Le test de détection du virus VHC doit être répété régulièrement après la fin du traitement.	()	()
29. Aujourd'hui, l'hépatite C peut être guérie dans presque tous les cas.	()	()
30. Le traitement de l'hépatite C prévient les dommages à long terme pour la santé.	()	()

	Je le savais déjà	C'est nouveau pour moi
31. Le nouveau traitement de l'hépatite C consiste en la prise de comprimés par voie orale pendant 8 à 12 semaines dans la plupart des cas.	()	()

32. Les lignes directrices internationales recommandent de proposer le traitement contre l'hépatite C à tous les usagers de drogues injectables ayant une infection chronique avec le virus de l'hépatite C, indépendamment du stade de la maladie	()	()
--	-----	-----

B. Hépatite B	Je le savais déjà	C'est nouveau pour moi
1. Le virus de l'hépatite B (VHB) peut être transmis par voie sexuelle, par le sang et par transmission de la mère à l'enfant	()	()
2. L'utilisation de préservatifs peut empêcher la transmission du VHB par voie sexuelle.	()	()
3. Comme pour l'hépatite C, mais de manière moins fréquente, l'hépatite B peut devenir une infection chronique.	()	()
4. Il existe un vaccin efficace contre l'hépatite B.	()	()
5. L'administration de trois doses de vaccin anti-VHB est un moyen efficace de prévenir l'infection par le VHB	()	()
6. Outre le VHC, le dépistage du VHB, du VIH et des infections sexuellement transmissibles est également recommandé pour les usagers de drogues injectables.	()	()

C. Statut personnel	oui	Je ne suis pas sûr	non
1. Connaissez-vous votre statut vis-à-vis de l'hépatite B ?	()		()

2. Connaissez-vous votre statut vis-à-vis de l'hépatite C ? () ()

3. Avez-vous été vacciné contre l'hépatite B ? () () ()

4. Votre employeur organise-t-il des tests de dépistage du VHC et de vaccination contre le VHB ? () () ()

D. Autres informations

1. À quelle fréquence fournissez-vous des services aux personnes usagers injecteurs de drogues ?
 régulièrement
 occasionnellement
 jamais

2. Dans quel type de structures travaillez-vous : (veuillez choisir 1 option)
 Structures à seuil bas (par exemple, centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues (CAARUD), structure de réduction des risques et des dommages: boutiques, salle de consommation supervisée)
 Structures de soins en ambulatoire, CSAPA
 Structures de soins avec hébergement
 Prison
 Autre
Si 'Autre' précisez s'il vous plait :

Merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à ce questionnaire.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur l'épidémiologie, la politique ou la pratique en matière d'hépatite C, veuillez consulter notre page de ressources sur l'hépatite C :

<https://europa.eu/!YC89Tn>

Il est important que les personnes qui travaillent dans les services en rapport avec les usages de drogue soient testées régulièrement, et soient vaccinées contre l'hépatite B – assurez-vous que VOUS CONNAISSEZ VOTRE STATUS.

Voyez où il est possible d'être testé: <https://ecdc.europa.eu/en/test-finder>

(24/7/2020)