



EMCDDA Harm Reduction Initiative – Verbetering van de HCV-tests en de verwijzingspraktijk voor mensen die drugs injecteren in drugshulporganisaties

Kennisvragenlijst voor drugshulpverleners

Inleiding:

Hoeveel weet u over virale hepatitis en de beschikbare testen en behandelingen? Deze korte vragenlijst zal ons helpen om erachter te komen over welke onderwerpen medicijnmedewerkers zich minder zelfverzekerd voelen, zodat er meer informatie en training op deze gebieden kan worden aangeboden - en we hopen dat dit een nuttige opfrissing voor u zal zijn!

De vragenlijst is anoniem en niet bedoeld om u te evalueren, zodat u volledig eerlijk kunt zijn zonder u zorgen te maken.

A. Hepatitis C	Ik wist dit	Dit was nieuw voor me
1. Het niveau van de hepatitis C-infectie in de algemene bevolking in Europa is over het algemeen laag (minder dan 2%).	()	()
2. Het niveau van de hepatitis C-infectie onder mensen die in Europa drugs injecteren is over het algemeen hoog (vaak 50% of zelfs hoger).	()	()
3. Het testen en behandelen van hepatitis C heeft voordelen voor zowel de behandelde personen als voor anderen, aangezien de overdracht van het virus wordt verminderd.	()	()
4. Hepatitis C virus (HCV) wordt voornamelijk via het bloed en af en toe tijdens de seks overgedragen.	()	()

	Ik wist dit	Dit was nieuw voor me
5. HCV is veel besmettelijker via bloed dan HIV.	()	()
6. HCV kan uren of zelfs dagen buiten het lichaam overleven.	()	()
7. HCV kan worden overgedragen door het delen van gebruikte spuiten en naalden.	()	()
8. HCV kan worden overgedragen door het delen van besmette filters.	()	()
9. HCV kan worden overgedragen door het delen van rietjes of buizen die worden gebruikt voor het snuiven van drugs.	()	()
10. HCV <u>kan niet</u> worden overgedragen via voedsel, drinkwater of door gewoon contact (handen vasthouden, knuffelen en zoenen).	()	()
11. HCV kan worden overgedragen onder mensen die drugs injecteren door het delen van een watercontainer om water op te trekken voor het injecteren van drugs.	()	()
12. Onder mensen die drugs injecteren is het mogelijk om geïnfecteerd te raken met HCV door het delen van lepels voor het voorbereiden van drugs voor injectie.	()	()
13. De eerste fase van het testen op hepatitis C omvat het testen op antilichamen tegen HCV (om te weten of de persoon anti-HCV positief is).	()	()
14. Er zijn snelle diagnostische tests ontwikkeld om anti-HCV op te sporen met behulp van bloed van een vingerprik of mondvloeistof. Ze zijn eenvoudig te gebruiken en geven snel resultaat (binnen 20 min.).	()	()
15. Anti-HCV-positief zijn kan betekenen dat iemand op dit moment geïnfecteerd is met hepatitis C of in het verleden geïnfecteerd is geweest en het virus heeft opgeruimd.	()	()

	Ik wist dit	Dit was nieuw voor me
16. Om te weten of een persoon op dit moment geïnfecteerd is, is een extra bloedtest nodig (Polymerase Chain Reaction (PCR) of kernantigeentest).	()	()
17. Wanneer zij goed geïnformeerd zijn, zal de meerderheid van de 'mensen die drugs injecteren die een test aangeboden krijgen, hun status accepteren en die informatie waarderen.	()	()
18. Voor mensen die zich blijven inlaten met risicovol drugsgebruik wordt regelmatig testen op HCV aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie.	()	()
19. Mensen met een acute HCV-infectie kunnen kort na de infectie specifieke symptomen vertonen (bijv. bovenbuikpijn, geelzucht, misselijkheid), hebben soms alleen niet-specifieke symptomen (vermoeidheid), maar hebben vaak geen symptomen.	()	()
20. Een HCV-infectie wordt in de meeste gevallen chronisch.	()	()
21. Het merendeel van de mensen met een chronische hepatitis C-infectie heeft al tientallen jaren geen klachten.	()	()
22. Het is niet mogelijk om aan het uiterlijk van een persoon te zien of hij of zij met HCV is geïnfecteerd.	()	()
23. Indien onbehandeld, kan chronische hepatitis C ernstige schade aan de lever veroorzaken en mogelijk leiden tot cirrose en leverkanker.	()	()
24. Er is geen vaccin voor hepatitis C.	()	()
25. Het is niet voldoende om naalden en andere apparatuur voor drugsgebruik af te spoelen met water om zich te beschermen tegen HCV-overdracht.	()	()
26. Condooms voorkomen seksuele overdracht van HCV.	()	()

	Ik wist dit	Dit was nieuw voor me
27. Na een succesvolle behandeling van hepatitis C is het mogelijk om opnieuw geïnfecteerd te raken als men opnieuw aan het virus wordt blootgesteld.	()	()
28. Tests op de aanwezigheid van het hepatitis C-virus moeten na afloop van de behandeling regelmatig worden herhaald.	()	()
29. Vandaag de dag kan hepatitis C in bijna alle gevallen worden genezen.	()	()
30. De behandeling van hepatitis C voorkomt langdurige schade aan de gezondheid.	()	()
31. De behandeling van hepatitis C bestaat uit pillen die meestal tussen 8 en 12 weken moeten worden ingenomen.	()	()
32. Internationale richtlijnen bevelen aan om alle mensen met een HCV-infectie die drugs injecteren te behandelen, ongeacht het ziektestadium.	()	()

B. Hepatitis B

Ik wist dit

Dit was
nieuw voor
me

1. Hepatitis B-virus (HBV) kan worden overgedragen via condoomloze seks of bloed, en ook van moeder op kind. () ()

2. Het gebruik van condooms kan seksuele overdracht van HBV voorkomen. () ()

3. Hepatitis B kan chronisch worden, maar dit komt veel minder vaak voor dan bij hepatitis C. () ()

4. Er bestaat een effectief vaccin voor hepatitis B. () ()

5. Om HBV-infectie te voorkomen moeten idealiter drie doses van het vaccin worden toegediend. () ()

6. Naast HCV wordt ook screening op HBV, HIV en seksueel overdraagbare aandoeningen aanbevolen voor mensen die drugs injecteren. () ()

C. Persoonlijke status

JA

BEN NIET
ZEKER

NEE

1. Kent u uw hepatitis B-status? () ()

2. Kent u uw hepatitis C-status? () ()

3. Bent u gevaccineerd tegen hepatitis B? () ()

D. Meer informatie

1. Hoe vaak levert u diensten aan mensen die drugs injecteren?

- regelmatig
- af en toe
- nooit

2. In wat voor soort faciliteit werkt u? (kies 1 optie):

- Laagdrempelige instantie (bijv. community-based harm reduction-programma: drop-in, gebruikruimte)
- Poliklinisch drugsbehandelcentrum
- Ambulant drugsbehandelcentrum
- Gevangenis
- Andere

Indien 'Andere? Geef aan:

.....

Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragenlijst.

Als u geïnteresseerd bent in meer informatie over de epidemiologie, het beleid of de praktijk van hepatitis C, bezoek dan onze Hepatitis C-resources-pagina:

<https://europa.eu/!YC89Tn>

Het is belangrijk dat mensen die werkzaam zijn in de drugsdiensten zich regelmatig laten testen en zich laten vaccineren tegen hepatitis B - dus zorg ervoor dat u UW STATUS KENT. Kijk waar je je kunt laten testen:

<https://www.ecdc.europa.eu/en/test-finder>

(23/7/2020)